

Acompanhamento Fonoaudiológico na Fissura Labiopalatina

— 150

— 140

— 130

— 120

— 110

— 100

— 90

— 80

— 70

— 60

— 50

www.liviascelza.com

GESTAÇÃO

Acolhimento à família e esclarecimentos quanto à alimentação, desenvolvimento de fala e audição do bebê. Orientações quanto à ordenha e armazenamento de leite materno.

NASCIMENTO

Estabelecimento da forma de alimentação mais segura e efetiva para mãe e bebê. Avaliação de sucção e deglutição; indicação de utensílios mais adequados; aplicação de bandagem terapêutica em lábio superior e indicação de placa obturadora de palato, quando necessários.

3 MESES

Orientações pré cirúrgicas (lábio). Após a cirurgia, acompanhamento da evolução do edema, cicatrização e adaptações na alimentação.

6 MESES

Esclarecimentos sobre introdução alimentar e desenvolvimento de linguagem.

9 MESES

Orientações sobre estratégias de prevenção de alterações de fala durante o balbucio (direcionamento de fluxo aéreo e pressão intra oral) a serem realizadas pelos pais.

1 ANO

Orientações pré cirúrgicas (palato). Acompanhamento da evolução da cicatrização. Acompanhamento do desenvolvimento de linguagem e fala e orientações para estimulação.

ENTRE 1 ANOS E 3 ANOS

Reavaliação de linguagem e fala com base na aquisição dos fonemas da língua, visando a intervenção precoce no caso de alterações na produção verbal. As reavaliações ocorrem em **frequência trimestral** para acompanhamento da evolução da fala e linguagem oral. Caso os pais percebam qualquer sinal de produção inadequada dos sons devem antecipar a consulta.

ENTRE 3 E 6 ANOS

Reavaliações **semestrais** da fala e avaliação das questões relacionadas à aprendizagem. Orientações pré e pós cirúrgicas (revisão de narinas e lábios e possíveis palatoplastias secundárias), abordagens manuais e instrumentais das feridas cirúrgicas e edema linfático.

ENTRE 8 E 12 ANOS

Orientações pré e pós cirúrgicas (enxerto alveolar), abordagens manuais e instrumentais das feridas cirúrgicas e edema linfático. Acompanhamento quanto a funções de respiração, mastigação e deglutição na presença de tratamento ortodôntico.

APÓS 18 ANOS

Orientações pré e pós cirúrgicas (rinoqueiloplastia e cirurgia ortognática), abordagens manuais e instrumentais das feridas cirúrgicas e edema linfático. Reavaliação e reabilitação, se necessário, das funções de respiração, mastigação, deglutição e fala.